

Cahier d'identification des Théclas d'Auvergne

Les Théclas sont des Lycaenidae de la sous-famille des Lycaeninae. Ils volent plutôt en juin-juillet, à l'exception du printanier Argus vert. Tous ont une petite queue sur l'aile postérieure, à l'exception encore une fois de l'Argus vert. La couleur de la face recto de leurs ailes antérieures et postérieures est bleue à brune sombre, ce qui peut permettre de les distinguer rapidement des Azurés. Quelques motifs peuvent varier selon les espèces. Cependant, il est nécessaire d'observer le verso des ailes pour une détermination fiable.

Huit espèces sont présentes dans le Puy-de-Dôme. Le but de ce cahier est de favoriser leur rapide identification sur le terrain afin d'entrer les données sur Faune-Auvergne. Quelques informations pratiques sur l'habitat et la période de vol des espèces sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. En pages suivantes, vous trouverez une clé d'identification des espèces auvergnates.

Nom commun	Nom scientifique	Habitat /PHL	Période de vol
Thécla de la ronce (Argus vert)	<i>Callophrys rubi</i>	Clairières, broussailles, taillis fleuris...	Mars-Juin
Thécla du bouleau	<i>Thecla betulae</i>	Bois de feuillus, clairières, bosquets. <i>Prunus spinosa</i>	Juillet-Septembre
Thécla du chêne	<i>Favonius quercus</i>	Chaînaies, broussailles. <i>Quercus sp.</i>	Juin-Septembre
Thécla du prunellier	<i>Satyrium pruni</i>	Fourrés de <i>Prunus spinosa</i> .	Juin-Juillet
Thécla de l'amarel	<i>Satyrium acaciae</i>	Broussailles sèches. <i>Prunus spinosa</i> .	Juin-Juillet
Thécla de l'yeuse	<i>Satyrium ilicis</i>	Broussailles sèches de <i>Quercus sp.</i>	Juin-Août
Thécla des nerpruns	<i>Satyrium spini</i>	Broussailles sèches, herbes.	Juin-Juillet
Thécla de l'orme	<i>Satyrium w-album</i>	Bois et lisières. <i>Ulmus glabra</i> .	Juin-Juillet

Clé d'identification des Théclas du Puy-de-Dôme :

1. Le verso des ailes antérieures et postérieures du papillon est de couleur :

_____ *Verte* :

Thécla de la ronce (Argus vert) (*Callophrys rubi*)



_____ *Brun orangé* :

Thécla du bouleau (*Thecla betulae*)



_____ *Gris clair*

Thécla du chêne (*Favonius quercus*)



_____ *Brun-Gris sombre* :

***Satyrion spp.* En cas de doute, renseignez Satyrion indéterminé (*Satyrion sp.*) en 2.**

2. Ligne basale :

_____ *Discontinue* + bande orange AP complète :

Thécla du prunellier (*Satyrium pruni*)



_____ *Discontinue* :

Thécla de l'amarel (*Satyrium acaciae*)



_____ *Discontinue* :

Thécla de l'yeuse (*Satyrium ilicis*)



_____ *Continue* :

voir en 3.

3. Ligne basale continue :

_____ *Tâche grise AP angle anal :*

Thécla des nerpruns (*Satyrrium spini*)



_____ *Pas de tâche grise, motif en W :*

Thécla de l'orme (*Satyrrium w-album*)

